

定期予防接種スケジュール(一例)

以下のスケジュールは標準的な接種スケジュール(一例)となります。具体的な接種スケジュールについては、かかりつけ医に相談しましょう。
市外で接種する場合は、接種前に予防接種実施依頼書等の申請が必要です。接種予定日の10日前までに保健予防課(TEL 0798-35-3308)にご連絡ください。

ワクチンの種類		2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	1歳 6か月	2歳	3歳	4歳	5歳	小学校 就学 前年度	7歳半 (90か 月)	9歳	11歳	12歳	13歳	20歳 未満	備考	
定期 予防 接種	生	ロタウイルス <R2.10.1~定期 接種化>	①	②																					ロタリックス：6週～24週までに2回接種 ロテック：6週～32週までに3回接種 ※ロタリックス、ロテックともに、1回目は 14週6日までの接種が推奨される。	
		ロタリックス (2回接種)	①	②																						
		ロテック (3回接種)	①	②	③																					
	不活化	B型肝炎	①	②				③																		1回目から20週(139日)をあげ て3回目を接種
	不活化	ヒブ	①	②	③							④														
	不活化	小児用肺炎球菌	①	②	③							④														
	不活化	四種混合 (DPT-IPV) ポリオ		①	②	③						④														四種混合を接種する場合は、 原則ポリオを接種する必要は ありません。
	生	BCG				①																				
	生	麻しん風しん混合 (MR)											①							②						2期：小学校就学前年度の4月1 日～翌3月31日までの間に接種
	生	水痘 (水ぼうそう)											①	②												1回目から3か月以上の間隔をあ けて2回目を接種(標準的には6 か月～1年あける)
不活化	日本脳炎														①	②	③				④				・4回目(2期)は9歳以上で接種 ・特別対象者(17.4.2～19.4.1生) は、日本脳炎の不足回数を20歳未 満の間にも接種可能	
不活化	二種混合 (DT)																					①			11歳～13歳未満で1回接種	

(注1) ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種方法は、初回接種の開始月例によって変わります。上記スケジュールは、初回接種開始時に生後2か月から生後7か月未満のお子さまの接種方法です。

初回接種開始が生後7か月以降のお子さまの接種方法は表面を参照してください。

(注2) 四種混合を接種する場合、原則ポリオ(単独)を接種する必要はありません。

(注3) 麻しん風しん混合第2期(5歳以上7歳未満)は、小学校就学前年度の4月1日から3月31日までの間(幼稚園年長相当年齢)、接種できます。

定期予防接種の対象年齢
(接種可能な期間)

日本脳炎特例対象者は13歳以上

標準的な接種期間(数字は接種回数)

<他の種類のワクチンを接種する場合の接種間隔>

※複数回接種する必要がある同一ワクチンの接種間隔は、それぞれのワクチンの規定に従ってください。

注射生ワクチン

BCG、MR、麻しん
風しん、水痘

27日(4週間)以上あける

別の注射生ワクチン

西宮市保健所 保健予防課
予防接種チーム
TEL: 0798-35-3308
FAX: 0798-33-1174